

【レジメン名】

FOLFOXIRI+Bmab 療法

【適応疾患】

結腸・直腸癌 進行・再発 術前補助 術後補助

【インターバル日数】

1 コース 14 日

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与法	投与時間	投与日
ペバシズマブ/Bmab 5mg/kg	点滴静注	30分～90分	day1
イリノテカン/CPT-11 165mg/m ²	点滴静注	1時間 30分	day1
レボホリナートカルシウム/l-LV 200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
オキサリプラチン/L-OHP 85mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
フルオロウラシル/5-FU 3200mg/m ²	持続静注	46時間	day1～2

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	d2	...	d14	d1
生理食塩液 プロイメンド	100mL 150mg	吐き気止め	点滴静注	30分	↓				↓
生理食塩液 デキサート アロキシ	100mL 9.9mg 0.75mg	吐き気止め	点滴静注	30分	↓				↓
生理食塩液 ペバシズマブ	100mL 5 mg/kg	抗癌剤	点滴静注	30分～90分	↓				↓
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	10分	↓				↓
5%ブドウ糖液 イリノテカン	250mL 150mg/m ²	抗癌剤	点滴静注	1時間 30分	↓				↓
5%ブドウ糖液 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	5-FU の 効果増強	点滴静注	1時間 30分	↓				↓
5%ブドウ糖液 オキサリプラチン	250mL 85mg/m ²	抗癌剤	点滴静注	2時間	↓				↓
5%ブドウ糖液 フルオロウラシル	500mL 2400mg/m ²	抗癌剤	持続静注	46時間	→				↓
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	10分	↓				↓

【内服スケジュール】

薬品名	目的	d1	d2	d3	d4	…	d14	d1
グラニセトロンゼリー 2mg/回 1日1回	吐き気止め	↓						↓
デカドロン錠 8mg/日 1日2回 朝昼食後	吐き気止め		↓	↓				
ウルソデオキシコール酸錠 300mg/日 1日3回 毎食後 * 必要に応じて	胆汁分泌を促して 副作用を予防	↓	↓	↓				↓
炭酸水素ナトリウム 1.8g/日 1日3回 毎食後2時間 * 必要に応じて	腸内をアルカリにし て副作用を予防	↓	↓	↓				↓
酸化マグネシウム 2g/日 1日3回 毎食後 * 必要に応じて	便秘による副作用 の悪化を予防	↓	↓	↓				↓
半夏瀉心湯 7.5g/日 1日3回 毎食前 * 必要に応じて	下痢を軽減する薬	↓	↓	↓				↓