

【レジメン名】

ALIMTA+Bmab 療法(維持療法)

【適応疾患】

非小細胞肺癌  進行・再発  術前補助  術後補助

【インターバル日数】

1 コース 21 日

【使用抗癌剤】

一般名/ 略号	投与法	投与時間	投与日
ペムトレキセド/ALIMTA 500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10 分	day1
ベバシズマブ/Bmab 15mg/kg	点滴静注	1 時間	day1

【注射スケジュール】

薬品名	投与量	目的	手技	点滴時間	d1	d2	...	d21	d1
生理食塩液 デキサート	100mL 6.6mg	吐き気予防	点滴静注	30 分	↓				↓
生理食塩液 アリムタ	100mL 500mg.m <sup>2</sup>	抗癌剤	点滴静注	10 分	↓				↓
生理食塩液 アバスタチン	100mL 15mg/kg	抗癌剤	点滴静注	1 時間	↓				↓
生理食塩液	50mL	ルートフラッシュ	点滴静注	30 分	↓				↓
メチコパール	1mg	アリムタの 副作用予防	筋注	アリムタ投与開始日の 7 日以上前に投与し、 以降 9 週毎 最終投与日から 22 日目まで					

【内服スケジュール】

薬品名	目的	d1	d2	d3	d4	...	d21	d1
パンビタン末 1g/日 1 日 1 回	アリムタの 副作用予防	アリムタ投与開始日の 7 日以上前に投与し、 以降 9 週毎 最終投与日から 22 日目まで						